



مراقبت از بیماری که بای اسفونفات مصرف می کنند

برای کنترل بیماری استخوانی مانند پوکی استخوان، دکتر ممکن است بای اسفونفات تجویز کند. این داروها میتوانند پیشرفت بیماری استخوانی را محدود کرده و از شکستگی استخوان جلوگیری کند ولی آنها فضای دهان را نیز تحت تاثیر قرار می دهند.

چگونه می توانم بفهمم که آیا دچار BRONJ شده ام یا خیر؟
علائم BRONJ عبارتند از قرار گرفتن استخوان آرواره در معرض دید، درد، تورم، طعم بد دهان و احساس بی حسی در لثه.

اگر این علائم را دارید یا نگرانی هایی در این موارد دارید لطفاً با بیمارستان دندانپزشکی رویال ملبورن Royal Dental Hospital به شماره تلفن 03 9341 1000 تماس گرفته و برای مراجعه به متخصص دندانپزشکی وقت بگیرید.
در بعضی از موارد یک دوره مصرف آنتی بیوتیک و بعضی از مسکن ها می تواند کارساز باشد.

چقدر احتمال دارد که در اثر مصرف بای اسفونفات ها مشکلی برای من بوجود آید؟

مشکلات ناشی از مصرف بای اسفونفات ها عمومیت ندارد ولی همانند تمامی رژیم های دارویی، طبق شرایط بدنی هر فرد میزان خطر آنها متفاوت است.

بطور متوسط فقط حدود 1 درصد بیمارانی که قرص های بای اسفونفات مصرف می کنند پس از جراحی دچار عوارض می شوند.

خطر بروز عوارض پس از جراحی در صورتی که تزریق بای اسفونفات داشته باشید بیشتر است.

چگونه این دارو فضای دهان من را تحت تاثیر قرار میدهد؟
یک عارضه جانبی بای اسفونفات (BRONJ) می باشد.

BRONJ عموماً بعد از جراحی دهان رخ می دهد و بخشی از استخوان آرواره در معرض دید قرار می گیرد.

اگر جراحی در دهان شما انجام نگرفته باشد، پایین افتادگی لثه ممکن است رخ دهد ولی بصورت نادر.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پوکی استخوان به سایت www.osteoporosis.org.au مراجعه نمایید.

برای جلوگیری از BRONJ چکار باید کرد؟
دستورالعمل های قبل از عمل دندانپزشک خود را دنبال کنید.

در مدتی که جراحات دهان شما التیام می یابد از گذاشتن دندانهای مصنوعی که می تواند جراحات را تحریک کند بپرهیزید.

و بخاطر داشته باشید که برای چک آپ مرتب به متخصص دندانپزشکی مراجعه نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره
03 9341 1000 تماس بگیرید یا

برای دستیابی به نزدیکترین کلینیک محلی
به سایت www.dhsv.org.au مراجعه کنید



dental health
services victoria
oral health for better health